

# ČERNÝ KAŠEL TETANUS ZÁŠKRT



**Vakcína Boostrix,  
kombinovaná vakcína  
proti záškrtu, tetanu  
a černému kašli.**



Minimálně jedno  
přeočkování v dospělosti  
je vhodné pro všechny.

## PRO KOHO JE VHODNÉ OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU BOOSTRIX?

### Je vám 25-30 let?

Čeká vás první přeočkování proti tetanu? Využijte možnost kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

### Plánujete do budoucna rodinu?

Černý kašel má obvykle nejzávažnější průběh u novorozenců a dosud nechráněných kojenců. Proto se doporučuje, aby se jejich nejbližší nechali očkovat kombinovanou vakcínou ještě před jejich narozením.

### Jste těhotná?

Očkování je doporučeno při každém těhotenství. Pro maximální přenos protilátek od maminky k ještě nenarozenému miminku je nejvhodnější zahájit očkování ve 3. trimestru - co nejdříve od 27. gestačního týdne.

### Nenašli jste se ani v jedné z výše uvedených skupin?

Minimálně jedno přeočkování v dospělosti je vhodné pro všechny.



## POČET DÁVEK: 1 POSILOVACÍ DÁVKA

- Vakcína se podává injekčně do svalu v horní části paže.
- Doporučené je přeočkování každých 10-15 let podle platných doporučení.

# CHRAŇTE SE VŠICHNI!

boostrix



NECHTE SE OČKOVAT PROTI ČERNÉMU KAŠLI, TETANU A ZÁŠKRTU VAKCÍNOU BOOSTRIX.

## PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ

## MOŽNÉ KOMPLIKACE

|                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ČERNÝ KAŠEL</b> | Nejprve jako běžné nachlazení (teplota, rýma, slzení, kašel). Později až velmi silný, dráždivý kašel, který může být dávivý, může znít jako „kokrhání“, přichází v záchvatech, spíše v noci, horečka.        | Dlouhodobá rekonvalescence. Krvácení z nosu. Krvácení do spojivek a očních víček. Zápal plic, zánět středního ucha. U nejmenších dětí může kašel vyvolat zástavu dýchání a úmrtí.                                                                |
| <b>TETANUS</b>     | Většinou náhlý začátek – křeče a zvýšené napětí žvýkacích svalů, dále stažení mimických svalů, svalů hltanu a ztuhlost šíje a čelistí. Obtíže až nemožnost polykání. Současné horečka, pocení, bolest hlavy. | Bez lékařské pomoci (antibiotika, sérum) může skončit úmrtím v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému.                                                                                                                            |
| <b>ZÁŠKRT</b>      | Zvýšená teplota až horečka, nechutenství, únava, polykací obtíže, zduření krčních lymfatických uzlin, šedavé povlaky na mandlích. Možné těžké problémy s dýcháním vyvolané otokem dýchací trubice.           | Záněty a poškození nervů, které může způsobit až trvalé ochrnutí hlasivek a polykacích svalů, dále je možné postižení hybnosti dolních či horních končetin. Postižení srdce (myokarditida). Dýchací obtíže, které mohou vést i k úmrtí udušením. |

**Orientační cena vakcíny Boostrix je 900 Kč\***



**Využijte příspěvek na očkování vakcínou Boostrix, např. 500 Kč od VZP.**

Možnost čerpání příspěvku na očkování a jeho výši je nutné vždy ověřit u příslušné pojišťovny.

**ZEptejte se na možnost očkování u svého lékaře!**

\* Přesnou cenu vakcíny si vždy ověřte u svého lékaře.

Vakcína Boostrix je registrovaný léčivý přípravek na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo s lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovnou informaci, dostupnou také na [www.gskkompedium.cz](http://www.gskkompedium.cz). Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na [cz.safety@gsk.com](mailto:cz.safety@gsk.com). Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Více informací



[na.vakciny.cz](http://na.vakciny.cz)



GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,  
tel.: 222 001 111, e-mail: [cz.info@gsk.com](mailto:cz.info@gsk.com), [www.gsk.com](http://www.gsk.com)

PM-CZ-BOO-LBND-250001  
Schváleno 10/2025