

5 DŮVODŮ

PRO OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU CERVARIX

-  V ČR žije přes 18 000 dívek a žen s diagnózou rakoviny děložního čípku.
-  Přibližně 800 žen ročně nově onemocní, 300 žen ročně na toto onemocnění umírá.
-  Účinnou formou prevence rozvoje HPV infekce je očkování.
-  Vakcína Cervarix je plně hrazena pro dívky i chlapce při zahájení očkování od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku.
-  Cervarix poskytuje 93% ochranu proti pokročilým předrakovinným změnám na děložním čípku bez ohledu na typ HPV, který lézi způsobil.*

**93% účinnost na předrakovinná poškození stadia (CIN3+) u dívek a žen ve věku 15-25 let, které se s HPV virem doposud nesetkaly (tzn. HPV návní) a které byly očkovány 3 dávkami vakcíny Cervarix.*

V běžné praxi nemusí vakcína dosahovat výsledků z klinických testů. Podobně jako u všech ostatních vakcín nemusí vakcína Cervarix chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá účinek na již aktivní HPV infekci nebo klinicky přítomné onemocnění. Pravidelný gynekologický screening proto zůstává velmi důležitý. K nejčastějším nežádoucím účinkům po aplikaci vakcíny Cervarix patří lokální reakce v místě vpichu, bolest hlavy a svalů.

Vakcína Cervarix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. **Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskompendium.cz.** Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

www.cervarix.cz

PM-CZ-CER-LBND-240001, schváleno:09/2024

GSK

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,
tel.: 222 001 111, e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz

Cervarix 

Cervarix 
www.cervarix.cz

GSK

**PŘED DOSPÍVÁNÍM
DĚTI NEOCHRÁNÍTE,
PŘED HPV INFEKČÍ MŮŽETE**

Vakcína Cervarix je plně hrazena pro dívky i chlapce při zahájení očkování od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku.

Pomozte chránit své děti před HPV viry očkováním ještě před zahájením sexuálního života.

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU V ČR

800

nových případů
onemocnění
ročně

18 000

dívek a žen žije
s danou
diagnózou

300

žen ročně
umírá

80 %

DÍVEK A ŽEN SE V PRŮBĚHU
ŽIVOTA INFIKUJE HPV

Ve většině případů se organizmus vypořádá s HPV infekcí sám. Pokud infekce vysoce rizikovými HPV viry přetrvává, může vést až ke vzniku rakoviny děložního čípku.

MOŽNOSTI PREVENCE

Vhodnou prevencí vzniku rakoviny děložního čípku je kombinace gynekologických prohlídek a očkování. Pouze očkování dokáže účinně zabránit rozvoji infekce a dosahuje nejvyššího účinku před setkáním s HPV viry, tedy před zahájením sexuálního života.

U DÍVEK, KTERÉ SE S HPV DOSUD NESETKALY

Vakcína Cervarix snižuje riziko vzniku těžkých předrakovinných poškození (CIN3+) děložního čípku o **93 %** bez ohledu na typ HPV, který poškození způsobil.*

Vakcína Cervarix snižuje riziko nutnosti provedení chirurgických zákroků na čípku o **70 %**.**

*93% účinnost na předrakovinná poškození stadia (CIN3+) u dívek a žen ve věku 15-25 let, které se s HPV virem doposud nesetkaly (tzn. HPV naivní) a které byly očkovány 3 dávkami vakcíny Cervarix.

**V analýze na konci studie Cervarix snižoval nutnost definitivních terapeutických zákroků na čípku o 70,2 % u tzv. naivní populace (populace, která se doposud nesetkala s HPV infekcí).

**Téměř POLOVINA dívek
a žen NA PRAVIDELNÉ
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
VŮBEC NEPŘIJDĚ!**

PŘÍNOS OČKOVÁNÍ PRO DÍVKY



- 1. Individuální ochrana**
Prevence vzniku těžkých přednádorových změn děložního čípku, vulvy, vagíny i anu (řiti) a nádorů (karcinomů) děložního čípku a anu (řiti), které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV)
- 2. Snižování rizika nutnosti podstoupení chirurgických zákroků na čípku****
- 3. Ochrana potenciálních partnerů/partnerek**



PŘÍNOS OČKOVÁNÍ PRO CHLAPCE



- 1. Individuální ochrana**
Prevence vzniku těžkých přednádorových změn anu (řiti) a nádorů (karcinomů) anu (řiti), které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV)
- 2. Ochrana potenciálních partnerek/partnerů**



OČKOVACÍ SCHÉMA

Dívky a chlapci ve věku **9–14 let** jsou očkováni vakcínou Cervarix ve 2 dávkách. První injekce se aplikuje ve vybraný den, druhá injekce se podává mezi 5 a 13 měsíci po první dávce.

Pokud je jedinec **ve věku 15 let a starší**, obdrží 3 injekce.

První injekce: ve zvolený den.

Druhá injekce: měsíc po první injekci.

Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci.