

VAKCÍNA PROTI ŽLOUTENCE TYPU A

K očkování dětí **od 1 roku do 15 let (včetně)**
je určená vakcína Havrix Junior monodose.

Havrix
JUNIOR MONODOSE
Vakcína proti hepatitidě A

K očkování dospělých a dospívajících
od 16 let výše je určená vakcína Havrix.

Havrix
Vakcína proti hepatitidě A

Očkování vakcínami Havrix a Havrix Junior monodose se skládá ze 2 dávek.

První se aplikuje ve zvolený den, druhou (posilovací) dávku se doporučuje podat za 6 až 12 měsíců po první dávce, ale lze ji podat po dobu až pěti let po první dávce, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana.



1. dávka
den 0



2. dávka
za 6 až 12 měsíců
po 1. dávce

Vakcíny Havrix Junior monodose a Havrix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. **Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendum.cz.**

Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Upozornění: Očkování může být spojeno s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalové informaci. Tato vakcína má být podávána s opatrností u pacientů s fenylketonurií.

PM-CZ-HAV-LBND-250001 Schváleno 01/2025

GSK

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
tel.: 222 001 111; e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz

NAVŠTĚVUJE VAŠE DÍTĚ DĚTSKÝ KOLEKTIV?

Chraňte jej před **infekční žloutenkou typu A**,
která se zde může rychle a snadno šířit!

GSK

MÝT SI RUCE
NESTAČÍ,
NAKAZIT SE
JE TAK
SNADNÉ!

Havrix
JUNIOR MONODOSE
Vakcína proti hepatitidě A

VÍCE O ŽLOUTENCE ZDE



WWW.ZLOUTENKY.CZ

BUĎTE
PŘED
ŽLOUTENKOU
O KROK
NAPŘED!

Zeptejte se na očkování proti **žloutence typu A**
pediatra Vašeho dítěte ještě dnes!

DĚTI, KOLEKTIV, INFEKČNÍ ŽLOUTENKA



Nedílnou součástí vstupu Vašeho dítěte do kolektivu, školky, školy nebo kroužků je i **ochrana jeho zdraví**.

Základní očkování mají již za sebou, a proto je vhodný čas doplnit již absolvovaná očkování o očkování proti nemocem, které se mohou snadno a rychle šířit právě v dětských kolektivech – **jako je infekční žloutenka typu A**.

ŽLOUTENKA TYPU A

Je infekce jater způsobená virem žloutenky typu A. Přenáší se tzv. fekálně-orální cestou. To znamená, že se virus z organismu vylučuje stolicí a dál může být přenesen buď přímo např. **infikovanými rukama**, nebo nepřímo použitím **kontaminovaných potravin**, ledu v nápoji, nebo jen dotekem s **infikovaným předmětem**.

**MÝT SI RUCE
NESTAČÍ,
NAKAZIT
SE JE TAK
SNADNÉ!**

Stačí uchopit infikovaný předmět - například kliku u dveří toalety, hračku nebo pastelku. **Osobní hygiena - mytí rukou je důležitou součástí prevence žloutenky typu A, ale nemusí k zajištění ochrany stačit.** Virus žloutenky typu A je navíc velmi odolný. Při pokojové teplotě dokáže přežít několik týdnů, zmrazený dokonce několik let.

Žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace, nutná dlouhodobá dietní a režimová opatření. Od dětí se mohou nakazit rodiče i prarodiče, kdy u starších osob se zvyšuje riziko komplikací.

Nechte své děti proti žloutence typu A RADĚJI OČKOVAT!



Velmi účinnou formou prevence žloutenky typu A je očkování. V současné době lze očkováním předcházet infekční žloutence typu A a B. **Děti jsou v ČR v raném věku plošně očkovány pouze proti žloutence typu B.**

V kombinaci s očkováním proti žloutence typu A tak bude Vaše dítě kompletně očkováno proti všem vakcinací preventabilním žloutenkám.

Dokončené očkovací schéma pomáhá chránit dlouhodobě.



**MYSLETE
NA OČKOVÁNÍ
PROTI
ŽLOUTENCE
TYPU A
VČAS!**



Zeptejte se pediatra Vašeho dítěte na možnosti očkování proti infekční žloutence typu A ještě dnes. **Informujte se u své zdravotní pojišťovny, jakou částkou na toto očkování přispívá.**