

JAK SE PROJEVUJE

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) se na počátku obtížně rozpoznává. Prvotní příznaky se mohou podobat běžnému nachlazení nebo chřipce, a proto může být onemocnění pozdě diagnostikováno.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍZNAKY



HOREČKA



ZVRACENÍ



BOLEST
HLAVY



ZTUHLOST
ŠÍJE



SVĚTLO-
PLACHOST




LETARGIE



VYRÁŽKA

Vyrážka je typickým příznakem meningokokové sepse, což je celková reakce organismu na infekci. Na kůži nemocného se typicky tvoří zvětšující se drobné krevní výronky (červené, skvrnité vyrážky, tzv. petechie). Jejich příznačným rozlišovacím znakem je, že pokud na ně zatlačíte skleničkou, nezmizí (kůže nevybledne) a je tady vážné podezření, že se jedná o sepsi.



Máte-li strach nebo podezření, že by mohlo jít o invazivní meningokokové onemocnění, **NEPRODLENĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.**

KOJENCI A MALÉ DĚTI

Meningokokem může onemocnět každý, včetně dospělých, nejčastěji však nemoc postihuje děti kojeneckého a předškolního věku a riziko opět stoupá u adolescentů.

Nejvyšší výskyt případů onemocnění je u kojenců v prvním roce života, protože v tomto období mají kojenci stále nezralý imunitní systém. Proto je důležité zahájit očkování co nejdříve (podle oficiálního doporučení).

Bexsero je vakcína proti meningokokům skupiny B. Podává se jedincům od 2 měsíců věku, aby je chránila před onemocněními způsobenými bakterií *Neisseria meningitidis* skupiny B.



JDE O ČAS

Meningokokové onemocnění se může rychle rozvinout z počátečních nespecifických příznaků a končit až smrtí již během 24–48 hodin. Jde doslova o minuty.

Přibližně 1 z 10 pacientů navzdory lékařské péči zemře.

Až 1 z 5 přeživších pacientů si nese do dalšího života vážné následky.

MOŽNÉ NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ:

Trvalé poškození mozku, ztráta sluchu, amputace prstů/končetin, záchvaty.



ADOLESCENTI JSOU VYSTAVENI ZVÝŠENÉMU RIZIKU

Meningokokové onemocnění se přenáší kapénkovou cestou, například při kašli či kýchání. Sdílení a skupinové aktivity tak mohou činit dospívající zranitelnými vůči meningokokovému onemocnění.

RIZIKOVÉ AKTIVITY

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

LÍBÁNÍ

SDÍLENÍ JÍDLA A PITÍ

KOLEKTIVNÍ AKTIVITY

Téměř 1 ze 4 adolescentů může být bezpříznakovým nosičem meningokoka.



VYBRANÉ MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM

OČKOVACÍ SCHÉMA BEXSERO A MENVEO



OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM SKUPINY B VAKCÍNOU BEXSERO JE K DISPOZICI OD 2 MĚSÍCŮ VĚKU DLE NÁSLEDUJÍCÍHO OČKOVACÍHO SCHÉMATU:

VĚK V DOBĚ PRVNÍ DÁVKY	ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ	INTERVAL MEZI DÁVKAMI ZÁKLADNÍHO OČKOVÁNÍ	POSILOVACÍ DÁVKA
2 - 5 MĚSÍCŮ	2 DÁVKY	≥2 MĚSÍCE	1 dávka mezi 12 a 15 měsíci věku s prodlouhou nejméně 6 měsíců mezi základním očkováním a posilovací dávkou
2 - 5 MĚSÍCŮ	3 DÁVKY	≥1 MĚSÍC	
6 - 11 MĚSÍCŮ	2 DÁVKY	≥2 MĚSÍCE	1 dávka v 2. roce života s prodlouhou nejméně 2 měsíce mezi základním očkováním a posilovací dávkou
12 - 23 MĚSÍCŮ	2 DÁVKY	≥2 MĚSÍCE	1 dávka s prodlouhou 12 až 23 měsíců mezi základním očkováním a posilovací dávkou
2 a VÍCE LET	2 DÁVKY	≥1 MĚSÍC	u jedinců, kteří jsou vystaveni setrvalému riziku expozice meningokokovému onemocnění, má být zvaženo podání posilovací dávky dle oficiálních doporučení



OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM SKUPIN A, C, W-135 A Y VAKCÍNOU MENVEO JE K DISPOZICI OD 2 LET VĚKU DLE NÁSLEDUJÍCÍHO OČKOVACÍHO SCHÉMATU:

VĚK V DOBĚ PRVNÍ DÁVKY	ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ	POSILOVACÍ DÁVKA
2 a VÍCE LET	1 DÁVKA	potřebu a načasování podání posilovací dávky u jedinců dříve očkovanych vakcínou Menveo je třeba určit podle národních doporučení



Mějte před meningokokem náskok

Zeptejte se na očkování pediatra vašeho dítěte ještě dnes

Více o invazivním meningokokovém onemocnění zde:



meningokoky.cz

Vakcíny Bexsero a Menveo jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahláste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovanych. PM-CZ-BEX-LBND-240007, Schváleno 01/2025



Meningokok umí změnit život navěky

Díky očkování se vaše plány nemusí rozpadnout



OČKOVÁNÍ HRAZENO

při zahájení očkování do 1 roku a od 14 do 16 let*

*Uvedené podmínky úhrady se vztahují k očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokoky skupiny B.

MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) není časté, ale závažné onemocnění způsobené bakterií *Neisseria meningitidis* (meningokok). Téměř všechna onemocnění jsou způsobena 5 skupinami *Neisseria meningitidis* (A, B, C, W, Y), proti kterým lze chránit očkováním. V České republice se nejčastěji vyskytují meningokoky skupin B a C.

IMO nejčastěji způsobuje:

MENINGITIDU (zánět mozkových blan)

Mezi projevy onemocnění patří horečka, zvracení, bolesti hlavy, porucha vědomí, křeče.

SEPSI (otravu krve)

Meningokoková sepsa je celková reakce organismu na infekci. Na kůži nemocného se tvoří zvětšující se drobné krevní výronky a postupně selhávají životně důležité orgány.