

Plané neštovice

Víte, jak se chránit?



2 vteřiny nutné k aplikaci vakcíny
mohou předejít **2 týdnům** trápení

- Plané neštovice jsou jedním z nejčastějších infekčních onemocnění na celém světě.
- Inkubační doba je průměrně 12 – 16 dní, pacienti jsou infekční již 48 hodin před výsevem neštovic. Infekčnost přetrvává do zaschnutí posledního puchýřku.

VarilrixTM
ŽIVÁ VAKCÍNA PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM

www.vakciny.cz





Plané neštovice nejsou k smíchu

- Typický je výsev svědivých neštoviček, které se vyskytují především na hlavě (včetně vlasů) a na trupu. Někdy bývají i na sliznicích dutiny ústní, v zevním zvukovodu nebo v okolí genitálu.
- Výsev neštoviček na kůži i sliznicích je nepříjemný, neštovičky svědí. Pokud si je nemocní škrábou, mohou si do rány zanést infekci, což může vést k vytvoření jizviček.
- Pravděpodobnost výskytu závažných komplikací se zvyšuje v dospělém věku a u osob s jinými přidruženými onemocněními.

Jaký je přínos očkování proti planým neštovicím?

- Očkováním téměř vyloučíte riziko rozvoje těžkých komplikací planých neštovic.
- Očkováním výrazně snížíte pravděpodobnost, že vaše dítě plané neštovice vůbec dostane.

Očkovací schéma

1. dávka



věk 9 měsíců
a výše

Varilrix™

ŽIVÁ VAKCINA PROTI PLANÝM NEŠTOVICÍM



2. dávka



interval nejméně
6 týdnů

Vakcína Varilrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje pod kůži nebo do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže nebo do stehna). O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlase na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c,
140 00 Praha 4, tel.: 222 001 111;
e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz